



بررسی رابطه پره اکلامپسی با پیامدهای نامطلوب بارداری در مادران مراجعه کننده به

بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال ۸۸-۱۳۸۷

زهرا عالیوند^۱، مرضیه پیروی^۲، صغری خانی^۳

- ۱- دانشکده مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
- ۲- دانشکده پزشکی مقطع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
- ۳- گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات شایعی که برای مادران باردار به عنوان گروه آسیب پذیر مطرح است بیماری پره اکلامپسی میباشد که این عارضه از علل شایع مورتالیتی و موربیدیتی مادری و نوزادی در تمام دنیا محسوب میشود بدین منظور مطالعه حاضر جهت تعیین رابطه پره اکلامپسی با پیامدهای نامطلوب بارداری در مادران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری انجام گرفت.

مواد و روشها: این مطالعه به روش تحلیلی به صورت مورد-شاهدی انجام گرفته که از بین مادران مبتلا به پره اکلامپسی ۱۰۶ نفر به عنوان گروه مورد و از مادران سالم ۱۰۴ نفر به عنوان گروه شاهد به طور تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه آینده نگر عوارض و پیامدهای نامطلوب بارداری مادری و جنینی و علائم آن در بین دو گروه مورد و شاهد بررسی و با هم مقایسه گردید.

یافته ها: نتایج این مطالعه نشان میدهد که بین پره اکلامپسی و سردرد ($p < 0.001$)، اختلال بینایی ($p < 0.001$)، درد اپی گاستر ($p < 0.001$) میزان زایمان سزارین ($p = 0.0001$)، میانگین سن مادر ($p = 0.005$)، میانگین سن حاملگی ($p = 0.0001$)، وزن هنگام تولد ($p = 0.0001$)، زایمان زود رس ($p < 0.0001$)، IUGR ($p = 0.001$) سابقه قبلی پره اکلامپسی ($P = 0.009$)، آپگار دقیقه اول زیر ۷ ($P = 0$)، رابطه ی معناداری وجود داشت ولی بین پره اکلامپسی و دکولمان (در هر گروه دو مورد)، دفع موکونیوم جنینی ($P = 0.07$)، سابقه قبلی سقط ($P = 0.098$) و سابقه قبلی IUGR ($P = 0.57$) رابطه ی معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری و توصیه ها: در مطالعه حاضر بیشترین پیامد مادری پره اکلامپسی به ترتیب میزان زایمان سزارین مادر، سردرد، اختلال بینایی، درد اپیگاستر، اکلامپسی، جدا شدن زودرس جفت و بیشترین پیامد جنینی و نوزادی به ترتیب زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد، آپگار دقیقه اول زیر ۷، محدودیت رشد داخل رحمی و مورتالیتیه پره ناتال بودند، در حالیکه در مطالعه ای دیگر در عوارض مادری بیشترین رابطه به ترتیب مربوط به جدا شدن زودرس جفت، اکلامپسی، کوما بود و در عوارض جنینی بیشترین عوارض مربوط به تاخیر رشد داخل رحمی، زایمان زودرس و مرگ داخل رحمی بوده است. [۳]

واژگان کلیدی: پره اکلامپسی، پیامدهای نامطلوب بارداری